

FOTONA INTIMA LASER SPECIJALIZOVAN ZA GINEKOLOŠKE TRETMANE

Poseduje robotski skener, za vrhunsku pouzdanost i preciznost, dvostruke talasne dužine, jednostavan za upotrebu. Sigurnost i delotvornost potvrđena na preko 100 000 pacijenata. Integrirani skener omogućava automatsku isporuku laserske energije, optimalnu tačnost i preciznost laserskih talasa, uz optimalno vreme trajanja tretmana, povećanu udobnost i praktičnost za operatera.

Šta tretiramo FOTONA intima laserom?

1. Stress inkontinencija urina

- Tretman je minimalno invazivna procedura.
- Poboljšava potporu uretre fototermalnim jačanjem zida vagine.
- Lečenje najbolje deluje kod pacijenata sa umerenom i blagom stres inkontinencijom, a sa vrlo dobrim rezultatima i kod teške urinarne inkontinencije. Uspeh zavisi od: godina starosti, telesne mase, trenutnog stepena spada, stepena izraženog problema. Potpuno izlečenje je oko 60%, značajno poboljšanje u 90% slučajeva a kod 10 % žena nema poboljšanja. Odgovor na stimulaciju laserom je individualan.

Što se tiče trajnog efekta – neko treba da ponovi tretman za god dana a neko ne mora po 4-5 god, mada se savetuje da se ponovi svake 2 god čak i ako nema tegoba da tkivo bude što bolje.

2.

Laserski tretman za sindrom vaginalne relaksacije -fototermalno zatezanje vaginalnog kanala bazirano na skupljanju vezivnog tkiva u zidu vagine

Tokom porođaja kada beba prođe kroz vaginu neizbežno mora doći do rastezanja i mikrottrauma koje zarastu ali tkivo nije više onakvo kakvo je bilo nego je opuštenije. Nažalost osećaj široke vagine može da ostane značajno dugo posle porođaja sa svim poslednjim nelagodnostima. Najčešće nezadovoljstvo pri seksualnim odnosima i subjektivni osećaj da je vagina otvorena i da zijapi. Prvih 6 meseci do godinu dana organizam se oporavi koliko može, a ako osećaj široke vagine ostane i posle tog perioda i duže, predlaže se laserska terapija. /Laserska rejuvenacija vagine/

Cilj postupka je poboljšanje tonusa i funkcije vezivnog tkiva i pri čemu se zatežu opušteni vaginalni zidovi i sužava obim vagine. Laser deluje na remodeliranje neokolagena i neokolagenogenezu što dovodi do stvaranja novog kolagena i povećanje elastičnosti

tretiranog tkiva. Metoda je bezbolna, neinvazivna obavlja se ambulantno. Mali broj pacijenata prijavljuje blago peckanje tokom procedure. Nakon ginekološkog pregleda i pripreme pre laserskog tretmana pacijentima se aplikuje lokalni anestetik u vidu kreme kako bi se svaka nelagodnost otklonila. Tretman traje 10-15 minuta. Pacijenti primećuju poboljšanje nakon nekoliko nedelja do 2 meseca. Nakon tretmana, nema ozbiljnih nelagodnosti nakon nekoliko nedelja do 2 ili crvenilo koje brzo prolazi ili rozikast vaginalni iscedak, retko pacijenti oseće svrab. Pacijentkinjama se preporučuje da pre intervencije nemaju seksualne odnose 24 h i da ne aplikuju bilo kakve vaginalne proizvode pre tretmana, a nakon tretmana isto se preporučuje do 48 h. Oporavak je brz, pacijentkinje se odmah mogu vratiti uobičajenim aktivnostima istog ili sledećeg dana.

Broj tretmana zavisi od stepena, odnosno težine problema koji se tretira i može biti od 2-5 tretmana sa razmakom između tretmana je 30-45 dana.

3.

Prolaps genitalnih organa / cystocoele I i II stepena /

Tretman FOTONA intima laserom je siguran i neinvazivan način lečenja za spad prednjeg vaginalnog zida i spuštanja bešike I i II stepena, (malo spuštena ili dopire do ulaza u vaginu samo pri napinjanju ili kašlju). Laserom se postižu odlični rezultati sa precizno kontrolisanim laserski indukovanim fototermalnim učinkom čiji efekat je ispoljen stimulacijom, i sintezom novih kolagenih vlakana, što deluje na skupljanje i zatezanje vaginalnog kanala bez uklanjanja tkiva.

Za razliku od operativnih procedura, ukupni uticaj i opterećenje na pacijentov organizam je minimalan.

Pristup je individualan. Radi se 3-5 tretmana, poboljšanje bez tegoba traje do 2 godine, nakon toga ga treba ponoviti, iako nema tegoba da bi se tkivo održalo u dobrom stanju.

4. Renova laserski tretman -Nežni vaginalni tretman vaginalne atrofije genitourinarnog sistema u menopauzi. -Neablativni tretman, fototermalni efekat vaginalnog kanala, korišćenjem vrlo niskih energija koji uzrokuju blagu hiperemiju i podstiču mikrovaskularizaciju i regeneraciju tkiva. Obnavlja normalnu strukturu i funkciju vaginalne sluzokože. Može se preporučiti ženama u postmenopauzi koje ne mogu uzimati hormone i koje su imale Ca dojke.
5. Druge indikacije gde možemo koristiti laser -površna dispareunija kod žena u menopauzi -kod ponavljanja uporne kandidijaze -kod intersticijskog cistitisa / 1x mesečno tokom 12 meseci / -ublažavanje dugoročnih problema vezanih za ožiljak od epiziotomije.

